

## PRESCRIPTION PCR MULTIPLEX GASTRO-INTESTINAL : CONDUITE A TENIR

### **Si SUSPICION GASTRO-ENTERITE (Diarrhées +/- vomissements +/- fièvre +/- Déshydratation)**

<b>+ Contexte</b>	<b>1<sup>ère</sup> intention</b>	<b>2<sup>ème</sup> intention</b>
Patient Immunodéprimé	TDR Rota/Adeno/Norovirus + Coproculture	Si les 2 Négatifs + SC persistants + Avis Gastro ⇒ Filmarray*
Retour de voyage	TDR Rota/Adeno/Norovirus + Coproculture	Si TDR négatif + Avis Gastro/infectio ⇒ Filmarray*
TIAC	TDR Rota/Adeno/Norovirus + Coproculture	Si TDR négatif + Avis Gastro/infectio ⇒ Filmarray*
Exclusion d'infection pour Diagnostiquer MICI	TDR Rota/Adeno/Norovirus + Coproculture	Si les 2 Négatifs + SC persistants + Avis Gastro ⇒ Filmarray*
Selles glairo-sanglantes Sans Antibiotique	TDR Rota/Adeno/Norovirus + Coproculture	Si les 2 Négatifs + SC persistants + Avis Gastro ⇒ Filmarray*
Selles glairo-sanglantes Avec Antibiotique	PCR clostridium difficile + Coproculture	Si les 2 négatifs + SC persistants + Avis Gastro ⇒ Filmarray*
Enfant	TDR Rota/Adeno/Norovirus + Coproculture	Si TDR négatif + SC gravité (fièvre, déshydratation majeure, suspicion SHU...) ⇒ Filmarray* Si les 2 négatifs + SC persistants sans gravité ⇒ Filmarray*

Si ces conditions ne sont pas respectées, la PCR multiplex sera annulée par le biologiste.

Rappel: la PCR multiplex gastrointestinal est réalisée UNIQUEMENT en période ouvrable et une selle fraiche est nécessaire avec un délai pour arriver au laboratoire de 2 heures maximum.