

Etiquette Patient

Nom :
 Prénom :
 Date de naissance : .../.../...



Prescripteur :

Service :

Date : **Obligatoire** :

A renvoyer par fax au laboratoire d'Hématologie-Hôpital Cardiologique, Haut-Lévêque, fax : 05.57.65.68.45.
 Contacts : Labo internes 74089 Jour-Nuit 15042. Responsable d'activité Dr Christine Mouton

Type d'héparine : Date d'introduction : Arrêt : OUI /NON

Indication et contexte clinique :

Thrombopénie :

NP numération plaquette

- Diminution NP > 50% et nadir \geq 20 G/L et pas de chirurgie dans les 3 J précédents +2
- Diminution NP > 50 % mais chirurgie dans les 3 J précédents ou Diminution de la NP de 30 à 50 % ou Nadir entre 10 et 19 G/l ou *Non remontée de la NP en post-op cardiaque (PO4)* +1
- Diminution de la NP < 30% ou nadir < 10 G/L 0

Délai de survenue de la thrombopénie (Temps)* :

- Entre 5 à 10 j après héparine ou \leq 1 j si héparine récente < 30 j +2
- Entre 5 à 10 j après héparine mais cinétique plaquettaire pas franche (manque de NP) ou délai > 10 jours ou \leq 1 j si héparine ancienne (30-100 j) +1
- Chute des plaquettes \leq 4 j sans exposition récente à l'héparine (plus de 100 j) 0

Thrombose :

- Nouvelle thrombose veineuse ou artérielle confirmée ou nécrose cutanée Ou réaction systémique après héparine IV +2
- Extension d'une thrombose préexistante ou récurrence sous traitement anticoagulant ou suspicion de thrombose non confirmée ou réaction cutanée non nécrosante après héparine IV/SC Ou thrombose d'un Hémofiltre +1
- Aucun événement 0

AuTre cause possible de thrombopénie :

- Aucune autre cause de thrombopénie +2
- Autre cause possible +1
- Autre cause certaine de thrombopénie 0

* To = 1^{er} jour d'exposition à l'héparine. Début de la thrombopénie = le jour où les plaquettes commencent à diminuer, mais en général il faut 1 à 3 jours de plus pour affirmer la thrombopénie à un seuil fonction du contexte et du taux de base.




Fig. 2. Algorithme pour le diagnostic et le traitement des thrombopénies induites par l'héparine (TIH) reposant sur la clinique (score prétest des « 4Ts » pour la suspicion) et les résultats des tests biologiques.