



## Laboratoire de Pharmacologie-Toxicologie (Pr Françoise Stanke)

Institut de Biologie et Pathologie, CHU de Grenoble, CS10217, 38043 Grenoble cedex 09  
Tél : 04 76 76 54 92 – Fax : 04 76 76 56 64



### FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE DOSAGE DE LA DAPTOMYCINE (CUBICIN®)

(à joindre au bon de demande)

#### PATIENT

NOM : .....

Prénom : .....

Date de Naissance : ...../...../.....

#### PRESCRIPTEUR

Service : .....

Nom : .....

☎ : .....

#### TRAITEMENT

Date d'initiation de traitement (ou de modification de posologie) : .....

Contexte : .....

Posologie de daptomycine (quantité administrée et fréquence) : .....

#### PRELEVEMENT (tube héparinate de lithium sans gel)

Concentration résiduelle (toxicité) : prélever juste avant la nouvelle injection

Concentration maximale (efficacité) : Prélever entre 0 et 30 min après la fin de la perfusion

	date	heure
Dernière administration		
Prélèvement		

#### RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Poids du patient : .....

Créatinine : .....

CPK : .....

Prélèvement	Tube héparinate de lithium sans gel
Transport	Plasma congelé (-20°C)
Cotation	BHN 120
Délai de rendu	7 jours